

## オキアミ

分類：オキアミ目 オキアミ科 甲殻類  
 学名：*Euphausia superba*  
 英名：Krill

全世界の海洋に分布するが、特に南極海の南ジョージア近海に濃密群が形成される。ヒゲ鯨類の格好な餌料となっていて、シロナガスクジラの分布はオキアミ類のそれと、完全に一致する。体長は5cmほどで、生後2～3年で産卵を開始するが、仔魚期は水深750m付近の深層で生活する。成魚では日中100～200mに降下し、夜間になると水表面近くに浮上する日周運動を繰り返す。エビ類に良く似ているが、オキアミの鰓は胸部の脚の付け根に露出し、エビのそれは胸甲に内蔵されていること、またエビにはない10個の発光器があって、黄～黄緑色の光を出し、3～6秒の点滅を繰り返す。日本近海では、ヒゲフトテナガオキアミ *Stylocheirom carinatum* が多産する。



1963



1978



1971



## 南極海の生物

25<sup>P</sup> ウロコノトの一種  
 スズキ目 ノトセニア科  
*Notothenia neglecta*

50<sup>P</sup> コオリカマス的一种  
 スズキ目 コオリウオ科  
*Chaenocephalus aceratus*

1<sup>L</sup> カニクイアザラシ  
 食肉目 アザラシ科  
*Labodon Carcinophagus*  
*Crabeater seal*

3<sup>L</sup> シロナガスクジラ  
 鯨目 ナガスクジラ科  
*Balaenopterus musculus*  
*Blue whale*

オキアミ  
 オキアミ目 オキアミ科  
*Euphausia superba*  
*Krill*

