

シロナガスクジラ

分類：鯨目 ヒゲ鯨亜目 ナガスクジラ科(哺乳類)
 学名：*Balaenoptera musculus*
 英名：Blue whale

アリューシャン列島以南の北太平洋、北大西洋、南氷洋に分布し、南氷洋ではオキアミ類のクリル(*Kril*)を主食とし、北半球では小型オキアミ類を捕食するが、これらオキアミ類の分布水域とシロナガスクジラの回遊は一致していて、オキアミのいないところでの回遊は認められない。動物中最大の体長を誇り、最大のもので体長33m、体重170トンが記録されている。体色は灰青色で背面は淡色のカスリ模様がある。背鰭は比較的小型である。噴気は10~15m。尾鰭下面にはその分岐点から放射状にのびる線状の淡色模様(striation)がある。上顎は幅が広く可成り扁平している。耳垢が耳道にたまった耳栓は年齢判定に利用されるが、これによると性熟するに8~10年、寿命は90~100年と推定されている。



英領南極地域の
鯨類

1977.1.4

2P マッコウクジラ

分類
 鯨目 齒鯨亜目
 マッコウクジラ科
 学名
Piryseter catodon
 英名
 Sperm whale

8P ナガスクジラ

分類
 鯨目 ヒゲ鯨亜目
 ナガスクジラ科
 学名
Balaenoptera physalus
 英名
 Fin whale

11P ザトウクジラ

分類
 鯨目 ヒゲ鯨亜目
 ナガスクジラ科
 学名
Megaptera novaeangliae
 英名
 Humpback whale

25P シロナガスクジラ

分類
 鯨目 ヒゲ鯨亜目
 ナガスクジラ科
 学名
Balaenoptera musculus
 英名
 Blue whale

